

NUTRI ENRAIZADOR

¿Qué es el Nutri Enraizador?

Es una fórmula desarrollada para proveer de nutrientes y estimular el crecimiento de raíces.

¿Qué hace Nutri Enraizador?

La mezcla de N, P, K, Mg, S, Ácidos Húmicos, Fúlvicos, Algas de Género Ascophyllum y Auxinas, constituyen un suplemento adecuado para lograr un mejor brote de raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso.

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Recomendaciones
Tomate, chile, coles y lechuga.	En charolas de almácigo, mézclase de ½ a 1 kg. en cada 100 Lts. de sustrato, de tal forma que correspondan, aproximadamente a 50 mg/cavidad. Cuando las plántulas presenten de 3 a 4 hojas, riéguese con una solución al 1% cada 3 días hasta su transplante.
Espárrago, ajo, fresa y cebolla.	En almácigo, mézclase de ½ a 1kg. en cada 100 Lts. de sustrato, de tal forma que correspondan aproximadamente a 50 mg/planta. A los 15 días de emergidas las plantas, riéguese con una solución al 1% cada 3 días hasta su transplante. Al momento de transplantar sumérgase las raíces o bulbos en una solución al 1% por 5 min. En plantas establecidas aplíquese, vía foliar 3a 4 Kg./Ha. a los 7 y 14 días del transplante.
Tabaco.	En almácigo, riéguese con una solución al 1% cuando las plantas tengan de 2 a 3 hojas. Al momento del transplante aplíquese 50 a 80 cc de una solución al 1% a la base de cada planta. En plantas establecidas aplíquese vía foliar 3 a 4 Kg./Ha. a los 7 y 14 días del transplante.
Arroz.	Al momento del transplante sumérganse las raíces en una solución al 1% por 5 min., aplíquese vía foliar 2 a 3 Kg./Ha. 12 días después. En Siembra directa aplíquese vía foliar 2 a 3 Kg./Ha. a los 15 a 30 días de la siembra.
Pepino, melón, sandía, berenjena, frijol, chicharo, cacahuete y zanahoria.	Aplíquese 3 a 4 kg./Ha. cuando las plantas tengan de 2 a 3 hojas, dirigiendo la aspersión a la base de estas y repítase la dosis, vía foliar a los 7 y 14 días de la primera aplicación.
Papa.	Aplíquese vía foliar 4 a 7 kg./Ha. a la 1 ó 2 semanas de emergidas las plantas y efectúense 2 aplicaciones más con intervalos de 1 semana.
Maíz, sorgo, trigo y cebada.	Aplíquese 3 a 4 kg./Ha. cuando las plántulas tengan 15-20 cm. de altura, dirigiendo la aspersión a la base de éstas y repítase la dosis vía foliar a los 20 y 35 días de la emergencia.
Alfalfa.	Aplíquese vía foliar 4 a 6 Kg./Ha. después de cada corte, cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas.
Caña de azúcar.	Aplíquese vía foliar 6 a 9 Kg./Ha. en la etapa del petillo y repítase 10 a 15 días más tarde.
Frutales.	En el vivero, disuélvase 1 a 2 Kg. en 100 Lts. de agua y riéguese abundantemente 15 días antes del transplante; repítase la aplicación al momento del transplante o poco después.
Frutales.	Al momento del transplante a su lugar definitivo aplíquese 50 a 80 cc de una solución al 1% a la base de cada planta.